

ÉGALITÉS, INÉGALITÉS, SIGNES, VALEUR ABSOLUE.

I. Manipulations élémentaires d'égalités et inégalités

1) Égalités

Propriété.

Ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une égalité préserve l'égalité.
 Multiplier ou diviser par un même nombre (non nul) les deux membres d'une égalité préserve l'égalité.

Autrement dit :

Soient a et b deux réels, et λ un réel non nul, alors :

$$\begin{aligned} a = b &\iff a + \lambda = b + \lambda \\ &\iff a - \lambda = b - \lambda \\ &\iff a \times \lambda = b \times \lambda \\ &\iff \frac{a}{\lambda} = \frac{b}{\lambda} \end{aligned}$$

Propriété.

- Théorème du produit nul : un produit est nul si et seulement si l'un (au moins) des facteurs est nul :

$$a \times b = 0 \iff a = 0 \text{ ou } b = 0$$

- Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul (et son dénominateur est non nul) :

$$\frac{a}{b} = 0 \iff a = 0 \text{ et } b \neq 0$$

Exemple : résoudre les équations suivantes dans \mathbb{R} : $-2x + 3 = 7$ et $\frac{2x+1}{4x-3} = 0$.

2) Inégalités

- Le sens d'une inégalité est conservé lorsque :

- *
- *
- *





- Le sens d'une inégalité est inversé lorsque :

- *
- *



Illustration pour l'application des fonctions :



II. Tableaux de signes

On utilise un tableau de signes pour étudier le signe d'une expression sous la forme d'un produit ou quotient de plusieurs expressions dont on sait étudier les signes (polynômes par exemple ...).

1. Étudier séparément le signe de chaque facteur.
2. Construire un tableau avec une ligne pour x , et une ligne pour chaque facteur, et la dernière ligne pour l'expression complète.
3. La dernière ligne s'obtient par application de la règle des signes du produit ou quotient.



Attention :

- Dans la ligne des x , bien ranger les nombres dans l'ordre croissant ;
- mettre un signe dans chaque colonne, même s'il ne change pas d'une colonne à l'autre ;
- le produit d'un nombre avec 0 fait 0 de même que le quotient de 0 par un nombre non nul (0 « en haut ») ;
- le quotient d'un nombre par 0 (0 « en bas ») n'est pas défini, on met alors une double barre dans le tableau sous cette valeur.



Remarque : pour étudier le signe d'une somme, on peut la factoriser, ou mettre au même dénominateur, pour ensuite faire un tableau de signes.


Exemple : on note $f(x) = x + 5 - \frac{12}{x+1}$, construire le tableau de signes de $f(x)$ et en déduire la solution de l'inéquation $f(x) \geq 0$.

III. Valeur absolue

1) Définition, propriétés algébriques et interprétation géométrique

Définition.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on définit la **valeur absolue** de x par $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{sinon} \end{cases}$.



Exemples : $|-2,7| = \dots$; $|5,4| = \dots$; $|17 - 41| = \dots$

$|11 - x| = \dots$

si $x = -3,7$, alors $|x| =$

Propriétés algébriques.

Pour tous les réels x et y :


- $|xy| = \dots\dots\dots$ et, pour $y \neq 0$, $\left| \frac{x}{y} \right| = \dots\dots$
- $|x + y| \dots\dots\dots$ (*inégalité triangulaire*)
- $\sqrt{x^2} = \dots$

Exemples : $\sqrt{3^2} = \dots\dots\dots$ et $\sqrt{(-4)^2} = \dots$



Interprétation géométrique : la valeur absolue d'un nombre représente la distance entre ce nombre et 0, comme si on la mesurait avec une règle. C'est donc toujours un nombre positif.

Ainsi en particulier $|-x| = |x|$, car $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$




De la même façon, $|a - b|$ mesure la distance entre a et b , en particulier, $|a - b| = |b - a|$.


Par exemple $|2 - 3| = \dots$, $|3 - 2| = \dots$

2) Équations et inéquations avec la valeur absolue

- $|x| = 2$ signifie que la distance entre x et 0 est 2, donc $|x| = 2 \iff x = 2$ ou $x = -2$.
- $|x| \leq 2$ signifie que la distance entre x et 0 est plus petite que 2, donc $|x| \leq 2 \iff -2 \leq x \leq 2$.
- $|x| \geq 2$ signifie que la distance entre x et 0 est plus grande que 2, donc $|x| \geq 2 \iff \dots\dots\dots$



$|x - 3| \leq 1$ signifie que la distance entre x et 3 est plus petite que 1, soit $3 - 1 \leq x \leq 3 + 1$.



Propriété.

Pour tout réel X et tout réel positif C :

- $|X| = C \iff X = C$ ou $X = -C$
- $|X| \leq C \iff -C \leq X \leq C$ et $|X| < C \iff -C < X < C$
- $|X| > C \iff X \in]-\infty, -C[\cup]C, +\infty[$ et $|X| \geq C \iff X \in]-\infty, -C] \cup [C, +\infty[$

Exemples : résoudre $|x - 2| = 1$, $|x + 5| \leq 2$, $|2x - 1| \leq 3$ et $|x - 4| > 1$.

